

# ビジクリア配合錠の飲み方

ビジクリア配合錠は、大腸内視鏡検査を実施する前に、検査の支障になる腸内の内容物(便)をきれいに取りのぞく**錠剤タイプのお薬**です。

ビジクリア配合錠は、大腸内視鏡検査前に、50錠および水分を2ℓ飲むことになります。

## <準備するもの>

- ① ビジクリア配合錠
- ② 専用のコップ\*
- ③ チェックシート\*
- ④ 水またはお茶2ℓ




\* 専用のコップ、チェックシートはお薬とセットになっています。

**1** 薬**5錠**をPTPから取り出します。



**2** 水またはお茶を専用コップの**200mℓ**の目盛りまで入れます。



**3** PTPより取り出した薬5錠を、用意した水またはお茶で**15分以内**にお飲みください。



15分以内

- 1) コップの中の水は**全て**お飲みください。
- 2) お薬を飲んでいる間は、指定された量以上の水分はとらないでください。
- 3) お薬が飲みにくい方は、**15分以内で5錠を数回に分けて**お飲みください。

**4** チェックシートに記入します。



**5** **15分ごとに1~4**を繰り返し、**計10回**(50錠、2ℓ)お飲みください。

## 注意!

### <飲んではいけない水分>

- コーヒー、アルコール類、スポーツ飲料水、乳性飲料(牛乳、飲むヨーグルト)など
- 砂糖や固形物が入っている飲料(粒入りジュースなど)など

### <食事および飲水について>

- 大腸内視鏡検査当日は、検査終了まで食事はできません。また、ビジクリア配合錠を服用中は、指定された水分量以外は摂取しないでください。**ただし、ビジクリア配合錠の服用前および服用後には脱水を予防するために、適度に水分を摂取してください。**

### <具合が悪くなった場合・飲み方を間違った場合>

- ただちに医師または看護師に連絡してください。